



Mucositis-Therapie-Lösung 200 ml

Zusammensetzung:

Benzydaminhydrochlorid	300 mg
Lidocainhydrochlorid	1,0 g
Dexpanthenol	4,0 g
Propylenglykol	29,0 g
Hydroxyethylcellulose	0,8 g
Kollidon 25	5,0 g
Polysorbat 80	0,4 g
Saccharin-Natrium	44 mg
Orangenaroma	0,1 g
dest. Wasser	zu 200 ml

konserviert mit Parabenen!

Dosierungsanleitung und Art der

Anwendung:

Soweit nicht anders verordnet, 2 bis 3 mal täglich mit ca. 15 ml (1 Esslöffel) gründlich 20-30 Sekunden lang in Mund- und Rachenraum spülen und gurgeln.

Häufigere Anwendungen (bis zu 5 mal täglich) bei starken Schmerzen sind unbedenklich.

Mucositis-Therapie-Lösung ist eine gebrauchsfertige Lösung und wird unverdünnt im Mund- und Rachenraum verwendet.

Pharmazeutischer Hersteller:

Apotheke des
Universitätsklinikums Erlangen
Palmsanlage 3
91054 Erlangen
Tel. 09131/ 8539040
Fax 09131/ 8533045

Darreichungsform:

Lösung zum Gurgeln und als Mundspülung.

Hinweise:

Apothekenpflichtig

Anwendungsgebiete:

Mucositis-Therapie

Eine leichte Trübung der Lösung ist unbedenklich und nicht qualitätsmindernd!

Gegenanzeigen:

Überempfindlichkeit gegenüber Parabenen, Salicylsäure und andere NSA.

Mucositis-Therapie-Lösung ist nach Anbruch **1 Woche** im Kühlschrank haltbar!

Nebenwirkungen:

Selten Überempfindlichkeitsreaktionen, Brennen und Mundtrockenheit. Gelegentlich Photosensibilität. Sehr selten Laryngospasmus und Angioödem

Lagerung:

Dicht verschlossen, vor Licht geschützt.

Dauer der Haltbarkeit:

6 Monate

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln:

Ggf. andere Lokalanästhetika. Am Menschen sind keine Untersuchungen zu Wechselwirkungen mit anderen Arzneimitteln durchgeführt worden.

Nicht verwenden nach Ablauf des Verfalldatums.

Arzneimittel für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Schwangerschaft und Stillzeit:

Bei bestimmungsgemäßem Gebrauch keine Anwendungsbeschränkungen.